



DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

"UN EQUIPO HUMANO AL SERVICIO DE LA SALUD"

SUBDIRECCIÓN
SALUD

BOLETÍN No. 019
MARZO - 26 DE
2020

COMANDO GENERAL DE
LAS FUERZAS
MILITARES

SUBSISTEMA DE SALUD DE
LAS FUERZAS
MILITARES

DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

MG. JAVIER ALONSO
DÍAZ GÓMEZ
Director

CR. ROCÍO AYALA
Subdirección de Salud

CN. DIANA YOLANDA OSO-
RIO CHACÓN
Coordinación Grupo Salud
Pública

SMSM. YOHANA RUIZ G.
Salud Pública

PS. CLAUDIA MONTENEGRO
ACOSTA

Comunicaciones
Estratégicas



La Dirección General de Sanidad Militar se une al **día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino**

¿QUÉ ES EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO ?

El cáncer cérvico-uterino surge del crecimiento anormal de las células que se encuentran ubicadas en el cuello uterino. Es el segundo cáncer más frecuente en mujeres, convirtiéndose en una de las amenazas más peligrosas en la vida de ellas. Su principal causa es el virus del papiloma Humano (VPH).



De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología en Colombia, se reportan anualmente más de 3.853 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y mueren más de 1.775 mujeres por esta causa.

Durante el 2018, la Cuenta de Alto Costo del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares reportó que el 8.1% de casos de cáncer correspondían a cáncer en el tracto reproductor femenino.

¿QUÉ SÍNTOMAS SE PUEDEN PRESENTAR CUANDO TIENES CÁNCER DE CUELLO UTERINO ?

Los síntomas más comunes son:

- Sangrado vaginal anormal
- Sangrado después del sexo vaginal
- Sangrado después de la menopausia
- Sangrado y manchado entre periodos
- Dolor Pélvico
- Pérdida de peso

Las mujeres con cáncer de cuello uterino tienen derecho a recibir tratamientos integrales, de calidad y en igualdad de condiciones.

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA

Citología

- La citología vaginal se debe tomar a mujeres mayores de 25 años o antes si ya se iniciaron su vida sexual, el esquema de la toma varía de acuerdo a las necesidades de cada paciente. El esquema se inicia con la primera toma, si esta tiene resultado normal, la usuaria debe volver a realizarse la citología en un año, si en la segunda toma continúa normal, deberá regresar a los 3 años.
- La segunda prueba de tamizaje es la citología combinada con pruebas de detección del virus de papiloma Humano (ADN/VPV), en Mujeres de 30 a 65 años y se toma cada 5 años.



Vacunación contra el Papiloma Humano

- En Colombia, es gratuita para niñas escolarizadas de 9 a 17 años.
- Es segura: se han distribuido mas de 270 millones de dosis en todo el mundo.
- Preferiblemente debe ser aplicada en mujeres que no han iniciado vida sexual.

Señora Usuaria si el resultado de la Citología Cérvico Vaginal es **ANORMAL por favor consulte de inmediato al Establecimiento de Sanidad Militar al cual se encuentra adscrita.**

“El diagnóstico oportuno garantiza el éxito del tratamiento”



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento
Bogotá - Colombia
Teléfono 3238555 EXT. 1021
www.sanidadmilitar.mil.co
Twitter: @SanidadMilCo

