



COMANDO GENERAL
DE LAS FUERZAS
MILITARES

SUBSISTEMA DE SALUD
DE LAS FUERZAS
MILITARES

DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

MG. JAVIER ALONSO
DÍAZ GÓMEZ
Director

CR. ALEX VICTORIA
BARRERA PALOMAR
Subdirección de Salud

SMSM. CARLOS
CUELLAR SÁNCHEZ
Coordinación Grupo
Gestión en Salud

PS. JULIET SAAVEDRA
VALLEJO
Alto Costo - GRUGS

PD. KATHERINE
MONTENEGRO SHAEK
Comunicaciones
Estratégicas

**UN OBJETIVO:
ERRADICAR LA
POLIOMIELITIS**

**¡PONGAMOS FIN A
LA POLIO, SIENDO
UNA ENFERMEDAD
PREVENIBLE!**



SUBDIRECCIÓN
DE SALUD

BOLETÍN No. 099
OCTUBRE – 24 DE
2019

SANIDAD MILITAR SE UNE AL DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIOMIELITIS

La Dirección General de Sanidad Militar desde la Subdirección de Salud se une a la conmemoración del **Día Mundial contra la Poliomielitis**, el cual fue establecido por la Asociación Rotaria Internacional para conmemorar el nacimiento de Jonak Salk, quien encabezó el primer equipo que desarrolló una vacuna contra esta enfermedad. Desde entonces, este día sirve para concientizar sobre la importancia de la vacuna en los esfuerzos para erradicar el virus.



¿QUÉ ES LA POLIOMIELITIS?

**QUIERO
PONER
FIN
A LA
POLIO**



endpolionow.org/es | [#worldpolioday](https://twitter.com/worldpolioday)

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud-OPS, la Poliomielitis o Polio es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta el Sistema Nervioso Central. Puede causar inflamación del cerebro y de las neuronas motoras de la médula espinal, llegando a causar atrofia muscular, parálisis permanente, parálisis, deformidad y hasta la muerte. Los afectados son principalmente niños menores de 5 años.

Esta enfermedad no tiene cura, pero es prevenible. Cuando se administra varias veces, la vacuna anti-poliomielítica puede conferir una protección de por vida.

SÍNTOMAS INICIALES:

Incluyen fiebre, cansancio, dolor de cabeza, vómitos, rigidez en el cuello y dolor en los miembros. Una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible (generalmente de las piernas), y un 5% a 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios.

¿CÓMO SE CONTAGIA?

El poliovirus se transmite por vía oral, ya que, puede encontrarse en el agua o alimentos contaminados con materia fecal de una persona infectada. Al llegar al intestino el virus se multiplica y se excreta, propagándose entre unos y otros.



"UN EQUIPO HUMANO AL SERVICIO DE LA SALUD"

Los casos de poliovirus salvaje han disminuido en más de un 99% desde 1988, cuando se calculaba que había 350.000 casos en más de 125 países, en comparación con los 33 notificados en 2018. De las tres cepas de poliovirus salvaje (tipo 1, tipo 2 y tipo 3), el poliovirus tipo 2 se erradicó en 1999, y no se han dado casos debidos al poliovirus salvaje de tipo 3 desde el último notificado en Nigeria en noviembre de 2012.




- ✓ **La enfermedad se declaró formalmente eliminada en la región de las Américas en 1994.** Desde entonces, ningún niño en el continente se ha quedado paralizado por poliovirus salvajes.
- ✓ La OPS actualmente está colaborando con los países para asegurarse que cada año más de 95% de los menores de 1 año reciban la vacuna contra la Poliomielitis en todos los municipios de los países de las Américas.

PREVENCIÓN DE LA POLIEMIELITIS:

Para continuar con el esfuerzo de la erradicación de la polio es necesario fortalecer las acciones de vacunación, debido a que esta enfermedad no tiene cura ni tratamiento específico.

En Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social tiene en su esquema nacional la vacuna anti-poliomielítica y su aplicación tiene 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad, con 2 refuerzos a los 18 meses y 5 años.

HISTÓRICO DE LA EVOLUCIÓN DE LA VACUNACIÓN EN COLOMBIA



Fuente Manual Técnico Administrativo del PAI/ministerio de Salud y Protección Social
Año 2015 tomo 1



Uno de los objetivos del **Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares** desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI, es participar en el mantenimiento de la erradicación del virus salvaje de la poliomielitis, por tal razón se participa anualmente en las jornadas de vacunación masivas y se tienen disponibles puntos de vacunación en los Establecimientos de Sanidad Militar para que nuestros usuarios tengan acceso a ser vacunados en las edades establecidas por el esquema de vacunación actual en Colombia.



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento
Bogotá - Colombia
Teléfono 3238555 EXT. 1401
www.sanidadmilitar.mil.co
Twitter: @SanidadMilCo

