



COMANDO GENERAL
DE LAS FUERZAS
MILITARES

SUBSISTEMA DE SALUD
DE LAS FUERZAS
MILITARES

DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

MG. JAVIER ALONSO
DÍAZ GÓMEZ
Director

CR. ALEX VICTORIA
BARRERA PALOMAR

Subdirección de Salud

CN. DIANA YOLANDA
OSORIO CHACÓN
Coordinación Grupo
Salud Pública

SMSM. YOHANA RUIZ
GUERRERO
SSR

PD. KATHERINE
MONTENEGRO SHAEK

Comunicaciones
Estratégicas

**LA FALTA DE
INFORMA-
CIÓN Y DES-
CONOCIMIENTO
HACE QUE
LAS PERSONAS
QUE VIVEN
CON VIH
SEAN DISCRI-
MINADAS**



SUBDIRECCIÓN
SALUD

BOLETÍN No. 113
DICIEMBRE 01 DE
2019

SANIDAD MILITAR SE UNE AL “DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA”

¿QUÉ ES EL VIH - SIDA?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud-OMS, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es aquel que ataca el sistema inmunitario debilitando los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados tipos de cáncer.

A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia. Esto aumenta el riesgo de contraer numerosas infecciones, cánceres y enfermedades que las personas con un sistema inmunitario saludable pueden combatir.

La fase más avanzada de la infección por el VIH es el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida o **Sida** que en función de la persona, puede tardar de 2 a 15 años en manifestarse. Las personas que padecen sida pueden contraer ciertos tipos de cáncer e infecciones o presentar otras manifestaciones clínicas de gravedad.



DATOS Y CIFRAS DEL COMPORTAMIENTO ESTADÍSTICO DEL VIH A NIVEL MUNDIAL:

De acuerdo al reporte del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida ONUSIDA, las estadísticas mundiales sobre la epidemia de VIH para la vigencia 2018 son las siguientes:

 37,9 millones de personas vivían con el VIH, de los cuales 36,2 millones son adultos y 1,7 millones son niños menores de 15 años.

 El 79% de las personas que vivían con el VIH conocía su estado serológico con respecto al VIH. Alrededor de 8,1 millones de personas no sabían que vivían con el VIH.

ONUSIDA

DÍA
MUNDIAL
DEL SIDA
1 DE DICIEMBRE DE 2019

 32 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia al cierre de 2018.

 El 82% de las mujeres embarazadas que vivían con el VIH tuvieron acceso a medicamentos antirretrovíricos para evitar la transmisión del VIH a sus hijos.

 En ese año fallecieron 770.000 personas en todo el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el sida, frente a los 1,7 millones de 2004 y los 1,2 millones de 2010.

*Las comunidades promueven
la prevención del VIH.*



“UN EQUIPO HUMANO AL SERVICIO DE LA SALUD”

VIH EN COLOMBIA



Para el corte del 31 de enero de 2018 fueron reportadas 95.745 personas diagnosticadas con infección por VIH1, de las cuales 10.246 fueron casos nuevos para este período.

Se encontró que el 75,1% (número de casos: 71.942) eran de sexo masculino, donde por cada tres hombres hay una mujer infectada, con una edad promedio de 40,2 años.

Fuente : Cuenta de Alto Costo 2018

VIH EN EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES

De acuerdo al reporte de la Cuenta de Alto Costo para el 2018, el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares puede constatar que el 78,6% de los casos reportados corresponden a hombres y el 21,4% a mujeres, de los cuales el 99,3% son usuarios mayores de 15 años y el 0,7% corresponden a menores de 14 años.



21.4%
Sexo Feme-



78.6%
Sexo Masculino



99.3%
Mayores de 15



0.7%
Menores de 14 años

Fuente : Cuenta de Alto Costo SSFM -2018

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE VIH



Los síntomas de la infección por el VIH difieren según la etapa de que se trate, muchos infectados ignoran que tienen la enfermedad hasta estar en fases más avanzadas. A veces, en las primeras semanas que siguen al contagio la persona no manifiesta ningún síntoma, mientras que en otras ocasiones presenta un cuadro seudogripal con fiebre, cefalea, erupciones o dolor de garganta.

A medida que la infección va debilitando el sistema inmunitario, la persona puede presentar otros signos y síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausencia de tratamiento pueden aparecer enfermedades graves como tuberculosis, meningitis criptocócica, infecciones bacterianas graves o cánceres como linfomas o sarcoma de Kaposi, entre otros.

Fuente : Organización Mundial de la Salud

ANTE CUALQUIER SÍNTOMA CONSULTE DE INMEDIATO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR MÁS CERCANO Y SOLICITE LA PRUEBA DE VIH



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento
Bogotá - Colombia
Teléfono 3238555 EXT. 1061
www.sanidadmilitar.mil.co
Twitter: @SanidadMilCo



EL VIRUS DE VIH ÚNICAMENTE SE TRANSMITE POR LAS SIGUIENTES VÍAS:**VÍA SEXUAL**

Al tener relaciones sexuales sin protección (preservativos) y contacto directo con la mucosa oral, genital o anal, se expone a la infección por VIH.

VÍA SANGUÍNEA

Al compartir jeringas, agujas, otro material de inyección u objetos corto punzantes.

VÍA MADRE/HIJO

A través de la placenta en el embarazo, en el momento del parto o la lactancia materna.


EL VIH NO SE TRANSMITE POR LOS SIGUIENTES MECANISMOS

- Besos
- Caricias
- Lágrimas
- Sudor
- Saliva
- Tos o Estornudo
- Compartir objetos como celulares
- Compartir alimentos o cubiertos de mesa
- Compartir duchas, piscinas, baños y establecimientos públicos



¡NO MÁS DISCRIMINACIÓN!

DISCRIMINAR A LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH O SIDA SOLO GENERA DESINFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD.

¿CÓMO PREVENIR

- Utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales.
- Realizar el cambio del preservativo cuando cambie la práctica sexual (oral, vaginal o anal).
- Si se utilizan lubricantes, se recomienda que sean solubles al agua, los demás pueden deteriorar el preservativo.
- No utilizar al mismo tiempo preservativo masculino y femenino en busca de doble protección, la fricción entre ellos hace que se deterioren.
- No compartir las jeringas y agujas para el uso de drogas inyectables.
- Si se encuentra expuesto al VIH accidentalmente, consulte de inmediato al Establecimiento de Sanidad Militar antes de las 72 horas.



**LAS
COMUNIDADES
marcan la diferencia**



**DÍA
MUNDIAL
DEL SIDA**
1 DE DICIEMBRE DE 2015



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento
Bogotá - Colombia
Teléfono 3238555 EXT. 1061
www.sanidadmilitar.mil.co
Twitter: @SanidadMilCo

