



COMANDO GENERAL
DE LAS FUERZAS
MILITARES

SUBSISTEMA DE SALUD
DE LAS FUERZAS MILI-
TARES

DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

MG. JAVIER ALONSO
DÍAZ GÓMEZ
Director

CR. ALEX VICTORIA
BARRERA PALOMAR
Subdirección de Salud

CF. DIANA YOLANDA
OSORIO CHACÓN
Coordinación Grupo
Salud Pública

PS. SAIDA DURÁN

PD. KATHERINE
MONTENEGRO SHAEK

Comunicaciones
Estratégicas

LOS MOSQUITOS
PONEN SUS HUEVOS
EN DEPÓSITOS DE
AGUA LIMPIA COMO
ALBERCAS, FLORE-
ROS, LLANTAS,
BALDES Y CUAL-
QUIER RECIPIENTE
QUE PUEDE ALMA-
CENAR AGUA. ALLÍ
SE DESARROLLAN
LAS LARVAS Y DES-
PUÉS PASAN A SU
FORMA ADULTA QUE
SON LAS QUE
TRANSMITE EL VI-
RUS.



SUBDIRECCIÓN
DE SALUD

BOLETÍN No. 001
JUNIO 25 DE
2019

SANIDAD MILITAR INFORMA: SOBRE EL DENGUE

¿SABE QUÉ ES EL DENGUE?

El dengue es una enfermedad viral febril aguda que es transmitida por la picadura de las hembras infectadas principalmente de la especie *Aedes aegypti* y en menor grado de *A. albopictus*. Se conocen cuatro serotipos distintos y se reconoce un espectro de manifestaciones de la enfermedad que va desde procesos asintomáticos hasta cuadros severos.




CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DENGUE:

Aspecto	Descripción
Modo de transmisión	La enfermedad se transmite por la picadura de la hembra infectada del mosquito <i>Aedes aegypti</i> o <i>Aedes albopictus</i> y un huésped susceptible.
Período de incubación	3 a 14 días
Período de transmisibilidad	Para transmitir la enfermedad es necesario que el mosquito haya picado a una persona infectada con el virus del dengue durante el período de viremia, que ocurre después de un período de incubación de aproximadamente 7 días. La hembra del mosquito <i>Ae. aegypti</i> es transmisora después de un período de 7 a 14 días de incubación. El mosquito hembra puede transmitir la enfermedad por el resto de su vida, que en promedio es de 10 días (rango: 1 -42 días).
Susceptibilidad	Toda persona que no haya presentado la enfermedad previamente por el virus y se traslade a zonas endémicas.

Fuente: Protocolo Dengue INS - 2019

DEFINICIONES OPERATIVAS DEL DENGUE - CASO PROBABLE:



Fuente: Protocolo Dengue INS - 2019


"UN EQUIPO HUMANO AL SERVICIO DE LA SALUD"



- Durante el V período epidemiológico, se notifica a través del Sistema de Vigilancia SIVIGILA, un total de 412 casos de dengue. Del total de casos el 81% se clasifica como probable.
- Teniendo en cuenta la clasificación final del caso reportada por la ficha epidemiológica diligenciada cuando se atiende un caso de dengue, se encuentra que el 56% de los casos se reportan con signos de alarma y de este total el 79,8% se hospitalizan.
- De acuerdo al momento de curso de vida, 1 infancia e infancia concentra el 44,6% del total de casos y Juventud y Adultez el 20,8%.

ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL ENTORNO:

- Adelantar campañas de recolección de inservibles que puedan acumular agua de lluvia (latas, botellas vacías, cubiertas, macetas), alrededores de toda la Unidad Militar.
- Mantener los elementos útiles en desuso boca abajo (baldes, frascos, techos).
- Vaciar todos los recipientes que contengan agua (tanques, barriles).
- Lavar cada ocho días los tanques y albercas que almacenen agua de uso doméstico. Debe aplicarse cloro con una esponja en las paredes de los tanques y albercas por encima del nivel de agua, dejar actuar por 15 minutos y posteriormente restregar con cepillo de cerda dura para desprender los huevos del vector.
- Cambiar el agua de floreros y bebederos de animales diariamente.
- Evitar colocar botellas plásticas atadas a los árboles y canteros.
- Evitar los criaderos de los mosquitos en los basureros.
- Remover los probables sitios de reposo en donde permanece el mosquito durante el día: rocas, troncos de los árboles, raíces, cuevas, erradicar basureros y limpiar continuamente los corrales donde se tienen animales de cría, entre otros.
- Realizar el adecuado mantenimiento de los sanitarios, lavamanos y las duchas.
- Tener en cuenta la presencia de residuos sólidos en los alrededores de la institución.
- Recomendar la utilización de los angeos en puertas y ventanas.



ACCIONES DE PREVENCIÓN A NIVEL PERSONAL:

- Vestir con ropa que cubra la mayor parte de la superficie corporal para protegerse de las picaduras.
- Utilizar mosquiteros o toldillos para proteger a los enfermos, o cualquier otra persona que repose durante el día. Puede aumentarse la eficacia de los mosquiteros usando toldillos insecticidas de larga duración (TILD), recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
- Evitar las actividades fuera de las viviendas entre 17:30 a 20:00 ya que los vectores transmisores son más abundantes y activos.

CÓRTALE LAS ALAS AL DENGUE.



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento
Bogotá - Colombia
Teléfono 3238555 EXT. 1063
www.sanidadmilitar.mil.co
Twitter: @SanidadMilCo

