



SANIDAD MILITAR INFORMA ACERCA DE LA LEISHMANIASIS

"UN EQUIPO HUMANO AL SERVICIO DE LA SALUD"

SUBDIRECCIÓN
DE SALUD

BOLETÍN No. 024
JULIO—29 DE
2020

COMANDO GENERAL
DE LAS FUERZAS
MILITARES

SUBSISTEMA DE SALUD
DE LAS FUERZAS
MILITARES

DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

MG. JAVIER ALONSO
DÍAZ GÓMEZ
Director

CR. ROCÍO GARZÓN
Subdirección Salud

MSM. SAIDA DURÁN
Vigilancia Salud
Pública

PS. SANDRA JULIANA
AGUIRRE M.
Líder Programa
Tuberculosis

PD. KATHERINE
MONTENEGRO SHAEK
Comunicaciones
Estratégicas




La Dirección General de Sanidad Militar desde la Subdirección de Salud- Grupo de Gestión del Riesgo en Salud informa a sus usuarios acerca de la **Leishmaniasis**.

¿QUÉ ES LA LEISHMANIASIS?

La leishmaniasis es una enfermedad de tipo zoonótico, es decir que se transmite de los animales a los humanos y es causada por un parásito del género *Leishmania*; este es transmitido a los humanos por la picadura de un mosquito (*lutzomyia*).


La enfermedad se puede presentar de diferentes formas y depende de su estado evolutivo y de la respuesta inmune del hospedero, provocando lesiones cutáneas, mucosas y/o viscerales.



La leishmaniasis se presenta en los cinco continentes, sin embargo se focaliza en algunos países.



Leishmaniasis Visceral: común en Bangladesh, Brasil, Etiopía, India, Sudán del Sur y Sudán.



Leishmaniasis cutánea: presente en varios países, sin embargo en los 10 países con más número de casos se encuentra Afganistán, Argelia, Brasil, **Colombia**, Etiopía, Irán, Nicaragua, Perú, Sudán y Siria, entre estos se encuentra el 79 al 75% de casos de la incidencia mundial.

"LA LEISHMANIASIS SE PRESENTA EN GRAN PARTE DE COLOMBIA"
¡INFORMATE!


¿CÓMO SE TRANSMITE?

1. El mosquito al picar al huésped (ser humano o animal) inyecta el parásito.

2. El parásito empieza una transformación dentro del huésped y se multiplica en los tejidos.


3. Cuando un mosquito no infectado pica a un ser humano o animal infectado, introduce en su intestino las células infectadas y el mosquito se infecta.

4. Es así en ese ciclo como se transmite y se infectan tanto los mosquitos como los seres humanos o los animales.




DATOS

La leishmaniasis en Colombia es una enfermedad endémica, es decir que se presenta frecuentemente en casi todo el territorio nacional, excepto en San Andrés Islas, Atlántico y Bogotá. La transmisión principalmente es en zona rural. La más frecuente de las formas es la leishmaniasis cutánea (entre el 95% y 98% de los casos), la leishmaniasis mucosa es resultado de la diseminación del parásito y se puede presentar de semanas a años después de la lesión cutánea (1% a 4%) y leishmaniasis visceral (entre el 0,1 y 1,5%).



El mosquito está presente en zonas boscosas o selváticas, en alturas menores a 1.500 metros sobre el nivel del mar.



EN LAS FUERZAS MILITARES

Por las zonas de operación, el personal militar se encuentra en mayor riesgo que la población en general. Siendo así, que para el año 2019 en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares se notificaron al SIVI-GILA 1.769 casos de Leishmaniasis, de las cuales el 98,9% fue Leishmaniasis Cutánea, 1.02% Leishmaniasis mucosa y el 0.06% de los casos se trató de Leishmaniasis Visceral.

La Dirección General de Sanidad Militar desde el área de Salud Ambiental, realiza actividades de educación en medidas preventivas, individuales y colectivas.

Se enfatiza en las medidas de control individual, para la no exposición al vector.



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento
Bogotá - Colombia
Teléfono 3238555 EXT. 1062
www.sanidadmilitar.mil.co
Twitter: @SanidadMilCo



¿CÓMO PREVENIR LA LEISHMANIASIS?

El control de vectores ayuda a reducir o interrumpir la transmisión de la enfermedad. Utilice **Insecticidas en aerosol y toldillos impregnados con insecticida**.



Utilice **repelentes**.



Use **ropa de manga larga** o que cubra gran parte del cuerpo.



Evite **transitar por la zonas de presencia del mosquito** en horas de la tarde, noche y amanecer que es cuando hay más riesgo.



Proteja a su mascota con un **collar impregnado de insecticida**.

Ante la presencia de una lesión sospechosa acuda al médico, consulte lo antes posible para garantizar un inicio de tratamiento oportuno en caso de ser necesario.