



SUBDIRECCIÓN
SALUD

BOLETÍN No. 009
MARZO – 26 DE
2021

COMANDO GENERAL
DE LAS FUERZAS
MILITARES

SUBSISTEMA DE SALUD
DE LAS FUERZAS
MILITARES

DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

MG. HUGO ALEJAN-
DRO LOPEZ BARRETO
Director

CR. ROCIO DEL PILAR
GARZÓN AYALA
Subdirección Salud

SMSM. SAIDA MARIA
DURAN ACOSTA

Coordinación Grupo
Gestión de Riesgo en
salud

SMSM. YOHANA RUIZ G.
Líder Salud Sexual y
Reproductiva DIGSA

PS. CLAUDIA
MONTENEGRO
Comunicaciones
Estratégicas



DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

"UN EQUIPO HUMANO AL SERVICIO DE LA SALUD"

La Dirección General de Sanidad Militar Subdirección de Salud– Gestión de Riesgo en Salud se une al **Día Mundial de la Prevención del Cáncer de cuello Uterino.**

¿QUÉ ES EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO ?

El cáncer es una enfermedad en la cual las células en el cuerpo se multiplican sin control. Cuando este comienza en el cuello del útero, se llama cáncer cervicouterino, cáncer de cérvix o cáncer del cuello del útero. Posteriormente el cáncer se puede extender a otras partes del cuerpo.



¿QUÉ CAUSA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO ?

La causa más significativa del cáncer de cuello uterino es la infección persistente por (VPH) Virus de Papiloma Humano. El VPH es muy común y la mayoría de las personas sexualmente activas entran en contacto con el virus durante su vida.

En la mayoría de las personas, el virus no causa daño y se soluciona sin tratamiento. Aunque la mayoría de los tipos de VPH son inofensivos, algunos pueden causar verrugas genitales y otros pueden causar alteraciones que pueden llegar a convertirse en cánceres, incluido el cáncer de cuello uterino.

El VPH se detecta en el 99% de los tumores de cuello uterino, en particular los subtipos VPH 16 y VPH 18.



Fuente: Organización Mundial de la Salud

¡EL CÁNCER CERVICOUTERINO SE PUEDE PREVENIR, TRATAR Y CURAR!



¿QUÉ SÍNTOMAS SE PUEDEN PRESENTAR CUANDO TIENES CÁNCER DE CUELLO UTERINO ?

Los síntomas más comunes son:

- Sangrado vaginal anormal
- Sangrado después del sexo vaginal
- Sangrado después de la menopausia
- Sangrado y manchado entre periodos
- Dolor Pélvico
- Perdida de peso



¿CÓMO SE DIAGNÓSTICA UNA LESIÓN PRECANCEROSA O EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO?

1. CITOLOGÍA CÉRVICO VAGINAL

La citología sirve para detectar los cambios en las células del cuello uterino ocasionadas por el VPH, el resultado puede ser Normal o Anormal. La muestra la toma el personal de salud usando una especulo o un cepillo durante un examen ginecológico.



Señora usuaria si los resultados de la citología son ANORMALES, deberá acudir de inmediato al Establecimiento de Sanidad Militar y continuar con las indicaciones o tratamientos ordenados por el personal de salud

Aunque se sienta bien y no tenga síntomas continúe el tratamiento indicado, el diagnóstico oportuno garantiza el éxito del tratamiento.

Fuente: Asociación de Patología cervical y Colposcopia



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento
Bogotá - Colombia
Teléfono 3238555 EXT. 1061
www.sanidadmilitar.mil.co
Twitter: @SanidadMilCo



2. COLPOSCOPIA


Consiste en explorar el cuello del útero mediante un lente a bajo aumento llamado “colposcopio” que permite examinar el cuello del útero con mayor precisión.

Tras aplicar una serie de líquidos, las lesiones premalignas del epitelio se hacen visibles por lo que podemos observar su tamaño y localización exacta.

Esta prueba no suele producir molestias diferentes a las que pueda producir la toma de la citología.



3. BIOPSIA DE CUELLO UTERINO



EL diagnóstico definitivo de la existencia de una lesión del cuello del útero requiere la realización de una biopsia. Si la colposcopia detecta alguna alteración en el cuello del útero sugestiva de lesión, el médico realizará una pequeña biopsia del área anormal. Para ello, se utilizan unas pinzas especiales que obtienen un pequeño fragmento de tejido. Este procedimiento suele realizarse sin ningún tipo de anestesia y, en la mayoría de casos, la molestia es escasa y tolerable.

Fuente: Asociación de Patología cervical y Colposcopia

¿CÓMO PREVENIR EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO ?

1. VACUNACIÓN FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Todas las vacunas comercializadas ofrecen una alta protección frente a los cánceres de cuello de útero y una proporción significativa de los cánceres de vulva, vagina, ano y orofaringe.

La vacuna previene de la infección pero no afecta a la eliminación de un virus existente en el momento de la vacunación (es preventiva, no curativa)



- En Colombia es gratuita para niñas escolarizadas de 9 a 17 años
- Preferiblemente debe ser aplicada en mujeres que no han iniciado vida sexual

2. USO DEL PRESERVATIVO



El preservativo protege en gran medida la infección. Sin embargo, incluso con un uso correcto (desde el inicio de la relación) y consistente (en todas las relaciones sexuales), no confiere una protección completa debido a que el área protegida por el preservativo es limitada y toda la piel de la región perineal es potencialmente infecciosa. La correcta utilización del preservativo ha demostrado una reducción significativa en la incidencia tanto de verrugas genitales o condilomas como de lesiones asociadas al VPH (60 – 70% de reducción frente a relaciones sexuales sin protección). Además, el preservativo protege frente a otras infecciones de transmisión sexual, como el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana), y frente a un posible embarazo no intencionado.