



LEISHMANIASIS CUTÁNEA Y MUCOSA (LC – LM)

«Un Equipo Humano al Servicio de la Salud»

Comando General
de las Fuerzas
Militares

Dirección General
de Sanidad Militar

Las leishmaniasis cutánea (**LC**) y mucosa (**LM**), son enfermedades infecciosas que afectan a la piel y las mucosas.

Son causadas por protozoos del género **Leishmania** y transmitidas a los animales y humanos por vectores de la familia **Psychodidae**.



Subdirección de
Salud

Grupo Salud
Operacional

Vigilancia
Epidemiológica

Mayo 2022

Las lesiones pueden comenzar como una pápula que evoluciona a nódulo redondeado, indoloro, que aumenta progresivamente de tamaño y se ulcera.



El período de incubación en los seres humanos es de 2 a 3 meses en promedio, pero puede tener períodos de incubación más cortos (2 semanas) o largos (dos años).



Las personas con LC tienen una o más lesiones en la piel y las úlceras pueden cambiar de tamaño y apariencia con el tiempo.



Inicialmente las úlceras están cubiertas por una costra y al desprenderse, se observa la úlcera típica de fondo limpio, color rosado y tejido granuloso, redondeada, de bordes regulares y elevados, indolora y de base indurada.

El tratamiento debe hacerse en forma ambulatoria, sistémica y prolongada, éste deberá efectuarse bajo supervisión del personal de los servicios de salud para garantizar la adherencia al tratamiento.