



DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO

La poliomielitis, es una enfermedad altamente contagiosa ocasionada por el virus de la polio.

Esta enfermedad es responsable de destruir partes del sistema nervioso, ocasiona parálisis total o parcial de las extremidades (manos y pies) y causar la muerte.



El virus entra al cuerpo por la nariz y boca, luego invade la garganta y el estómago hasta que invade la sangre y recorre todo el cuerpo.



La polio no tiene cura, pero puede prevenirse con la vacunación.



En 1994 Posterior un proceso de documentación y verificación, la Región de las Américas fue certificada como libre de la circulación del poliovirus salvaje.



Tienen mayor riesgo de adquirir la poliomielitis, las personas menores de 15 años de edad no vacunadas contra la polio; entre ellas los menores de cinco años son más susceptibles.



Este riesgo se incrementa cuando, en los lugares donde vive o visita esta persona, hay otras no vacunadas contra la polio. En estos ambientes, las malas condiciones de higiene incrementan aún más las posibilidades de infectarse con el virus de la polio.




Se debe sospechar la poliomielitis en los niños no vacunados, o parcialmente vacunados contra la polio.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Presenta una sintomatología similar a la de una gripe (fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, falta de apetito), y que parece que se recuperan y se sienten mejor; pero al cabo de 2 a 5 días después, presentan dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares intensos, movimientos musculares involuntarios y sensación de hormigueo en las piernas o brazos.

Uno a dos días después, aparece la disminución de la fuerza en las piernas o brazos, y la dificultad para caminar. La disminución de la fuerza progresa rápidamente hasta la parálisis, la que usualmente es desigual entre los miembros afectados.

ESQUEMA DE VACUNACIÓN



**A LOS 2,4 Y 6 MESES Y REFUERZO
A LOS 18 MESES Y 5 AÑOS**



**RECUERDA SI UN SÚPER HÉROE QUIERES SER,
LA VACUNA DEL POLIO DEBES TENER**