



PROTÉGETE CONTRA LA TOS FERINA

Es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa causada por la bacteria *Bordetella pertussis*.

Síntomas

Los primeros síntomas aparecen de 7 a 10 días después de la infección.

- Congestión nasal.
- Lagrimeo.
- Tos seca o convulsiva.
- Fiebre.
- Vómitos.

¿Cómo se transmite?

Se propaga con facilidad por el aire, a través de gotitas respiratorias expulsadas por personas infectadas al toser, estornudar o hablar.



Abril 2025



Medidas de prevención

- ✓ Tener el esquema de vacunación al día.
- ✓ Si estás embarazada vacúnate después de la Semana 26 de gestación, así proteges a tu bebé cuando nazca.
- ✓ Evita el contacto con personas que tienen síntomas respiratorios.
- ✓ Lavado frecuente de manos con agua y jabón.
- ✓ Al toser o estornudar cubre tu boca con un pañuelo.
- ✓ Usar tapabocas si tiene síntomas respiratorios.
- ✓ Quédate en casa cuando estás enfermo.
- ✓ Limpia y desinfecta frecuentemente las superficies de uso, incluyendo juguetes.



*¡Porque mi familia es mi prioridad,
por eso la llevo a vacunar!*



¡Cuidado con la Tos Ferina!

Verifica el esquema de vacunación

En Colombia se incluye la vacuna contra tos ferina a los 2, 4, 6 y 18 meses, así como un refuerzo a los 5 años.



En mujeres gestantes la vacunación Es una dosis de Tdap (Tétanos, difteria y tos ferina acelular) a partir de la semana 26 de gestación.

Si vives en Bogotá o zonas dispersas, se inicia la vacunación desde la 6ta semana de nacimiento y gestantes a partir de la semana 20 de gestación.

Recuerda esta es una medida de prevención que evitará la propagación de esta enfermedad.

Acércate al ESM más cercano y verifica el carnet de vacunación