



La salud
es de todos

Minsalud


ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA.

¿Qué es Enfermedad Diarreica Aguda?

Presencia de tres o más deposiciones líquidas en 24 horas. (Dura máximo 14 días).




Causas:



¿Cuáles son los signos de alarma de una EDA?

Acudir de inmediato al servicio de salud si el niño o la niña presentan:



¿Cómo cuidar en casa a un niño con EDA?



Carrera 46 No. 20 B 99 Cantón Occidental "Francisco José de Cárdenas"
Edificio Comando de Personal - Call Center (601) 426 1489 Ext. 38212

¿Qué cantidad de alimentos deben darse y con qué frecuencia?



Dar de comer al niño 6 veces al día. Cada 3 a 4 horas.

Dar porciones pequeñas y frecuentes de alimentos ricos nutrientes.

Sirva al niño una comida más de lo habitual por al menos 2 semanas después de que finalice el episodio diarreico

Fecha:
20/ABR/2023

Boletín No.
097

¿Cuánto líquido dar?



Después de cada deposición se debe dar:


Menores de 2 años: 50-100 ml de líquido.

Niños de 2 a 5 años: 100-200 ml.


¿Qué líquidos NO dar al niño/a?




Bebidas con alto contenido de azúcar.



Bebidas gaseosas.



Bebidas energizantes.



Jugos de frutas con conservantes.

Brigadier General **EDILBERTO CORTÉS MONCADA**
Director Sanidad Ejército

Elaboró: PS Dayarita Estefanía Manrique Avella,
Líder de Ruta Primera Infancia e Infancia DISAN EJC

Revisó: CT. María Angélica Mejía
Oficial Salud Pública DISAN EJC

Vo.bo: CR. Zulma Guzmán Ayala
Oficial Gestión Servicios de Salud DISAN EJC.

Carrera 46 No. 20 B 99 Cantón Occidental "Francisco José de Caldas"
Edificio Comando de Personal - Call Center (601) 426 1489 Ext. 38212