



BRIGADIER GENERAL

CARLOS IVÁN

MORENO OJEDA

Comandante Comando
de Personal

BRIGADIER GENERAL

GERMÁN LÓPEZ

GUERRERO

Director Sanidad Ejército

CR. GELVER

AUGUSTO DUARTE

SANDOVAL

Oficial Gestión Administra-
tiva y Financiera

**TC. NIDYA PATRICIA
PINEDA**

Oficial Gestión Servicios de
Salud

**TC. CLAUDIA MEN-
DEZ BEJARANO**

Oficial Salud Operacional

**PS. KATERINE FORE-
RO ORJUELA**

Coordinadora de ETV

En el Ciclo Ope-
racional las Me-
didas de Preven-
ción contra la
Fiebre Amarilla
no debes olvi-
dar.



DEPENDENCIA

BOLETÍN No. 01
JUNIO 27/2016

INTENSIFICACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA FIEBRE AMARILLA

¿QUÉ ES?

La fiebre amarilla es una enfermedad de áreas selváticas vírica aguda, hemorrágica transmitida por mosquitos infectados. El término "amarilla" alude a la ictericia que presentan algunos pacientes, puede cursar como una enfermedad banal y aún asintomática. Los casos se producen por invasión de los seres humanos a hábitat salvajes, donde principalmente los primates son reservorios de este virus.



AGUDO: Comienzo súbito con Fiebre, congestión conjuntival, dolor lumbar, dolor de cabeza, escalofríos, malestar general y vómito; dura aproximadamente tres días.

¿POR QUÉ EN ALARMA?


Durante el primer semestre del 2016, se notificó una mortalidad en un Militar en el Departamento del Meta por Fiebre Amarilla, por lo cual se hace necesario intensificar las medidas básicas de Prevención y Control.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

REMISIÓN: De pocas horas a dos días, periodo durante el cual baja la fiebre y la intensidad de los síntomas.



INTOXICACIÓN: Fiebre, vómito negro o con sangre en "cuncho de café", deposición negra, sangrado nasal, poca orina o ausencia de esta, color amarillo en la piel y manifestaciones en diversos órganos de la lesión hepática grave: trastornos de coagulación, hipotensión, insuficiencia renal y encefalopatía.



Patria, Honor, Lealtad

"Dios en todas nuestras actuaciones"

Fe en la Causa

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

- * Verificar antecedente vacunal de fiebre amarilla al 100% de la población Militar.
- * Verificar previo al ingreso del personal Militar a las zonas de riesgo, que cuenten con antecedente vacunal, en caso de no contar con este, asegurar la aplicación de la vacuna 10 días antes del ingreso.
- * Utilización de mosquiteros, toldillos y uniformes impregnados, para disminuir el contacto del mosquito con las personas.
- * Usar repelente de mosquitos para uso de adultos los cuales no deben sobrepasar una concentración de DEET y no pueden ser aplicados mas de tres veces al día.
- * Evitar quitarse la guerrera y/o quedarse expuesto especialmente entre las 16:00 hrs hasta las 7:00 hrs, tiempo en que el zancudo sale a infectar.
- * Evitar acostarse directamente sobre la maleza.
- * Rellenar con tierra los tanques sépticos y letrinas en desuso y/o abandonadas.
- * En aquellas zonas donde se encuentra personal en el área de operaciones, se recomienda que los camuflados sean impregnados con sustancias piretroides o permetrina.
- * Lavar con cepillo los tanques de almacenamiento de agua, canecas, para garantizar la remoción de huevos y larvas de Aedes Aegypti y mantenerlos tapados para que no entre el mosquito.

En caso de presentar los signos y síntomas de la Fiebre Amarilla, por favor acude e informa inmediatamente a tu SOCORRISTA MILITAR.



- * Evitar los recipientes que contengan agua limpia estancada para eliminar las larvas y los huevos del mosquito.
- * Drenar las aguas estancadas provenientes del agua lluvia y de todos los recipientes que contengan agua (tanques, barriles, latas, botellas vacías, cubiertas, macetas).
- * Eliminar el agua de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos, letrinas abandonadas y rellenando huecos de tapias y paredes donde pueda juntarse agua de lluvia.
- * Evitar colocar botellas plásticas y/o de vidrio atadas a los árboles y muros.
- * Mantener los elementos en desuso boca abajo (baldes, frascos, neumáticos, tanques, barriles, latas, botellas vacías, cubiertas, macetas).
- * Rellenar con tierra los tanques sépticos y letrinas en desuso y/o abandonadas.
- * Depositar las basuras en bolsas plásticas bien cerradas.
- * Mantener desmalezada el área de vivac.
- * Proteger al personal que presente síndromes febriles con mosquiteros para impedir el acceso de los mosquitos de actividad diurna y a su vez estos últimos se infecten al picar a los pacientes, en lo posible impregnar con insecticida y rociar el mosquitero alrededor de la cama del paciente.
- * Alertar al comandante del pelotón ante la presencia de monos muertos en zonas selváticas.

**DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO**

Cra. 7 No. 52 - 48
Bogotá - Colombia
Teléfono 4261434 EXT. 37276
www.disanejercito.mil.co
disanejc@ejercito.mil.co

